

ANNEXE II

NOTICE

MICROPAQUE SCANNER

Suspension buvable à diluer

Composition

Sulfate de baryum.....5,00 g

Excipients : parahydroxybenzoate de méthyle sodé, sorbate de potassium, citrate de sodium, acide citrique, sorbitol, gomme xanthane, émulsion de diméthicone à 30 pour cent (p/p), saccharine sodique, arôme abricot, eau purifiée.

Pour 100 ml

150 ml de suspension buvable à diluer en flacon de 150ml (polyéthylène opaque) ou de 500 ml (polyéthylène transparent).

Classe pharmaco-thérapeutique

PRODUITS DE CONTRASTE NON IODES.

(V : Divers)

Guerbet

B.P. 57400

F-95943 Roissy CdG cedex

Dans quel(s) cas utiliser ce médicament (indications thérapeutiques)

Ce médicament est un produit de contraste à base de sulfate de baryum. Il vous a été prescrit en vue d'un examen tomodensitométrique (scanner : radiologie permettant l'étude des tissus du corps humain) avec opacification du tube digestif.

ATTENTION !

Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament (contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
troubles liés à une obstruction ou à une perforation du tube digestif.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Mises en garde spéciales

Ne pas injecter.

Précautions d'emploi

En cas de régime pauvre en potassium, tenir compte dans la ration journalière de la présence de potassium

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Liste des excipients ayant un effet notoire

- Parahydroxybenzoate de méthyle sodé
- Sorbate de potassium : 55 mg de potassium par flacon
- Citrate de sodium
- Sorbitol : 5 g par flacon

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**Posologie**

A titre indicatif, selon le territoire du tube digestif à opacifier, il sera nécessaire d'absorber entre 500 et 1 000 ml de suspension.

Dans tous les cas, se conformer strictement à l'ordonnance du médecin.

Mode et voie d'administration

A 150 ml de suspension, il faut ajouter 350 ml d'eau et agiter soigneusement pendant 30 secondes. On obtient 500 ml de suspension prête à l'emploi contenant 1,5 pour cent de sulfate de baryum.

Suspension réservée à la voie orale ou éventuellement rectale.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINDER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Quelques rares nausées peuvent survenir lors de l'administration du produit.

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

Précautions particulières de conservation

La suspension diluée prête à l'emploi devra être utilisée immédiatement.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Février 2005