

# NOTICE

**MICROPAQUE COLON**, poudre pour suspension rectale

## Composition pour 100 g

Sulfate de baryum ..... 92,38 g

Excipients : Citrate de sodium; Bentonite ; Dioxyde de Titane ; Carmellose sodique.

## Forme pharmaceutique

Poudre pour suspension rectale en sachet, poche lavement et pot de 400 g

## Classe pharmaco-thérapeutique

PRODUIT DE CONTRASTE BARYTE

(V: Produits de contraste)

Guerbet

BP 57400

F-95943 Roissy CdG cedex

## Dans quel(s) cas utiliser ce médicament (indications thérapeutiques)

Ce médicament est un produit de contraste à base de sulfate de baryum.

Il vous a été prescrit en vue de réaliser un examen radiologique avec opacification du colon.

## ATTENTION !

## Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament (contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'occlusion ou de perforation de l'intestin.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN*

## Précautions d'emploi

Prévenir le radiologue si vous devez subir d'autres examens radiologiques dans les jours qui suivent cet examen.

Prévenir le radiologue en cas de constipation.

*EN CAS DE DOUTE N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN*

## Interactions médicamenteuses et autres interactions

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS. IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

## **Grossesse - Allaitement**

*D'UNE FACON GENERALE IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS PREVENIR VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT*

## **COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**

### **Posologie**

Ne pas ouvrir le conditionnement. La préparation sera faite par le radiologue.

A 400 g de poudre, ajouter :

- pour la technique du double contraste : 600 ml d'eau
- pour la technique par réplétion : 1200 ml d'eau

### **Mode et voie d'administration**

Voie rectale

### **EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

*COMME TOUT PRODUIT ACTIF CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.*

Constipation, diarrhées, douleurs abdominales à type de crampes.

Possibilité de ballonnements et de lipothymies (malaise passager avec sensation de perte de connaissance imminente).

*SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE..*

### **CONSERVATION**

**Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur**

### **Précautions particulières de conservation**

A conserver à l'abri du gel.

### **DATE DE REVISION DE LA NOTICE**

Février 2005