

ANNEXE II

NOTICE

Identification du médicament

Dénomination

MICROTRAST, pâte orale.

Composition qualitative/ composition quantitative

Sulfate de baryum.....70,00 g

Excipients : Glycérol, gomme xanthane, arôme vanille-caramel, saccharine sodique, sorbate de potassium (E202), parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E219), parahydroxybenzoate de propyle sodé (E217), acide sulfurique, eau purifiée

pour 100 g

Forme pharmaceutique

Pâte orale, tubes de 75 g, 150 g ou 800 g.

Classe pharmaco-thérapeutique

PRODUIT DE CONTRASTE BARYTÉ

(V : Produits de contraste).

Nom et adresse de l'exploitant

Guerbet

BP 57400

F-95943 Roissy CdG cedex

Dans quel(s) cas utiliser ce médicament (indications thérapeutiques)

Ce médicament est un produit de contraste à base de sulfate de baryum. Il vous a été prescrit en vue d'un examen radiologique avec opacification de la partie haute du tube digestif : pharynx, hypopharynx, oesophage.

ATTENTION !

Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament (contre-indications)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas de troubles liés à une obstruction ou à une perforation du tube digestif et en cas d'atrésie de l'oesophage (malformation de l'oesophage).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Mises en garde spéciales

Prévenir le radiologue si d'autres examens radiologiques ont été prévus dans les jours qui suivent cet examen et si vous êtes constipé.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE, N'HESITEZ PAS A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Interactions médicamenteuses et autres interactions

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS. IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - allaitement

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients

Glycérol, sorbate de potassium (E202), propylène glycol.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT**Posologie**

La quantité à administrer varie de 2 à 4 cuillères à soupe en fonction du type d'examen pratiqué.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Afin d'obtenir de meilleures images (absence de bulles d'air) il est recommandé d'avaler la pâte en évitant de la mastiquer.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : constipation.

Des cas exceptionnels de réaction allergique, d'occlusion, de fécalome baryté ont été décrits.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

Précautions particulières de conservation

A conserver à l'abri du gel.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Février 2005